

비스테로이드성 소염제

메타캠® 현탁액



Metacam® Oral suspension for dogs

Meloxicam 1.5 mg/mL

애완용 동물용의약품

처방대상 동물용의약품

원료약품 및 분량(본제 mL 당)

멜록시캠(Meloxicam,EP).....1.5mg
부형제 적량

성상 노란색의 점성 현탁액

효능 및 효과

- 대상동물: 애완용 개
- 급성과 만성 근골격계 질환에 의한 통증경감과 염증의 치료

용법 및 용량


- 첫날은 체중 kg 당 본제 4방울(멜록시캠 0.2mg)을 사료에 섞어 1회 투여
- 그 후 증상이 치료될 때까지 1일 체중kg당 본제 2방울(멜록시캠 0.1mg)을 사료에 섞어 투여

투여방법


체중 5kg 이하

1. 제품을 위아래로 잘 흔든다.
2. 뚜껑을 열어 사료위에 체중1kg당 메타캠® 현탁액을 2방울씩 떨어 뜨려준다.

체중 5kg 이상



1. 제품을 위아래로 잘 흔든다.
2. 제품의 뚜껑을 열고 제품과 동봉된 주사기를 병의 머리에 끼운 후 제품을 거꾸로 들고 주사기의 검정 고무바깥이 개의 체중과 일치할 때까지 메타캠® 현탁액을 빼낸다.



3. 제품을 바로 세운 후 주사기를 좌 또는 우로 비틀어서 제품으로 부터 빼어낸다.
4. 주사기를 눌러 메타캠® 현탁액을 사료에 뿌려준다.

주의사항

- 1) 휴약기간
다른 소염제로 치료한 개체에서 부작용의 증가를 유발할 수 있으므로 바로 사용하지 말고 치료약물의 약동학적 특성을 고려하여 최소 24시간의 휴약기간을 가진 후 사용할것
- 2)부작용
- 비스테로이드성 소염제의 전형적인 부작용인 식욕상실, 구토, 설사, 혈변, 무기력의 증상이 나타날 수도 있다.
- 매우 드물게 출혈성 설사, 토혈증, 위장관 궤양, 간효소 증가 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 부작용은 일반적으로 치료 첫 주에 나타나고, 일시적이며 치료말기에는 사라진다.
- 과량사용시 나타나는 부작용에 대해서는 대증치료가 선행되어야 한다.
- 부작용 발생시 치료를 중단하고 수의사의 조언을 구한다.
- 3)금기사항
- 탈수, 저혈압개체에 신장독성을 유발할 가능성이 있으므로 사용금지
- 위장관계, 간, 심장, 신장의 이상을 가지고 있는 개체에 사용금지
- 다른 비스테로이드성 소염제, 이노제, 항응고제, 부신피질호르몬제, 아미노글리코사이드계 약물과의 병용시 독성 유발 가능성이 있으므로 병용금지
- 임신 또는 비유중 사용금지
- 6주령 이하의 개체에 사용금지
- 본 제품에 과민반응을 보이는 개체에 사용금지
- 4)사용시 주의사항
- 비스테로이드성 소염제에 민감한 개체에 사용을 피할 것.
- 임상증상은 3-4일 이내에 호전되며 치료 후 10일까지 증상의 호전이 보이지 않는 경우 사용을 중지해야 함.
- 수의사의 지시에 따라 사용할 것.
- 유효기간 경과 후 사용하지 말 것.
- 정확한 용량을 사용할 것.
- 동물에만 사용할 것.
- 사용 전 잘 흔들어 사용할 것.
- 5)기타
- 사람이 복용 시 즉시 사용설명서를 들고 의사를 찾는다.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

포장단위 10mL, 32mL

제조사

Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V.
Calle Maiz Np. 49, Barrio Xaltocan, C.P. 16090, Mexico D.F., Mexico.

수입사

베링거인겔하임동물약품(주)
서울시 중구 통일로 10
연세재단세브란스빌딩 16층
Tel: 080-516-2894

- ▶ 제품의 안전한 사용을 위해 첨부 문서를 모두 읽은후 사용하십시오.
- ▶ 메타캠®(Metacam®)은 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 가 소유한 등록상표로, 베링거인겔하임동물약품(주)는 라이선스 사용권을 부여받아 사용중입니다.

저장방법 직사광선을 피하여 25℃이하에서 보관(얼리지 말 것)

유효기간 제조일로부터 3년
(개봉 후로부터 6개월)